

Link do produktu: <https://e-rolmet.pl/substral-saprol-srodek-grzybobojczy-spray-750ml-p-7898.html>



SUBSTRAL Saprol Środek Grzybobójczy SPRAY 750ml

Cena brutto	28,00 zł
Cena netto	25,93 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Substral

Opis produktu

SUBSTRAL Saprol Środek Grzybobójczy SPRAY 750ml

Substral Saprol. Zwalcza i Chroni. Gotowy do użycia długodziałający środek grzybobójczy do róż, kwiatów, roślin kwitnących. Zwalcza plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego. Do stosowania w domu i ogrodzie. Działa natychmiast po zastosowaniu. Zapewnia ochronę przed nowymi infekcjami do 3 tygodnie.

Środek działa: grzybobójczo, zwalczając czarna plamistość, rdzę i mączniaka prawdziwego.

Opakowanie: 750ml

Cechy produktu:

- gotowy do użycia
- zwalcza choroby grzybowe
- chroni przez 3 tygodnie
- natychmiastowe działanie

Substral Saprol - Dom, Ogród, Balkon. **Środek grzybobójczy do róż, rododendronów, hortensji, kwiatów i roślin kwitnących.** Gotowy do bezpośredniego użycia. Działa układowo. Wykorzystywany interwencyjnie i zapobiegawczo. Działa natychmiast po zastosowaniu oraz zapewnia ochronę przed nowymi infekcjami do 3 tygodni. Zwalcza czarną plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego. Bardzo szeroki obszar zastosowania od domu, przez balkon, aż po ogród.

Profilaktycznie, praktycznie 2-3 opryski mogą zabezpieczyć roślinę na cały sezon – szczególnie jest to ważne dla nowych nasadzeń. Zwalcza plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego na różach, roślinach kwitnących i zielonych, krzewach i roślinach iglastych. Ogranicza występowanie antraknozy i zamierania łusek żywotników (thuje). Wzmacnia wigor rośliny, nabłyszcza liście, zabezpiecza całą roślinę z nowymi odrostami.

Jak stosować

Środek stosować wyłącznie od kwietnia do września. Opryskiwać rośliny, zaraz po pojawieniu się pierwszych objawów chorób, następnie regularnie co 3 tygodnie do końca września. W ochronie róży (czarna plamistość, rdza) środek można stosować co 4 tygodnie. W przypadku dużego nasilenia występowania chorób opryskiwanie powtarzać co 14 dni. W przypadku gdy czarna plamistość róży wystąpiła w dużym nasileniu w poprzednim sezonie, opryskiwanie rozpocząć wiosną, w okresie pęknięcia pąków. (zawiązków).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.

Uwagi:

1. Opryskiwać podczas umiarkowanej pogody, nie stosować podczas silnego nasłonecznienia, suszy oraz mrozów.
2. Opryskiwać w ten sposób, aby cieczą użytkową pokryć górną i dolną część liści, unikając spływania kropel.
3. Nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny, szczególnie uprawne np. warzywa.
4. Przed zastosowaniem środka szczególnie na cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie

próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia roślin.

Zawartość substancji czynnej: tritikonazol (fungicyd z grupy triazoli) - 0,15 g/1L (0,015%).

Numer wpisu do rejestru 24/70/7605

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.